

ビケンワクチンニュース

【2008年9月号】



MRワクチン接種を受けましょう

「2006年度MRワクチン予防接種後健康状況調査」を見ると、I期MRワクチンと麻しん単抗原ワクチンの発熱、発疹、局所反応、けいれん、蕁麻疹の発生頻度は同等であるという結果が出ています。また、風しんワクチンについても、I期MRワクチンの副反応と風しん単抗原ワクチンの副反応は概ね同等であるという結果が出ています。麻しん単抗原ワクチンと風しん単抗原ワクチンを混合してMRワクチンとしても副反応の増強は認められなかったことから、MRワクチンはわが国における麻疹対策並びに風疹対策にきわめて有用であると考えられます。

予防接種後健康状況調査

	対象者	発熱 (37.5度以上)	局所 反応	けいれん	蕁麻疹	発疹	リンパ節 腫脹	関節痛
麻しん	2005年度	3,850	23.0%	2.9%	0.4%	3.3%	9.8%	-
風しん	2005年度	4,375	11.0%	1.2%	0.1%	1.1%	2.5%	0.4%
I期MR	2006年度	5,018	22.0%	1.8%	0.2%	3.0%	6.6%	0.6%
II期MR	2006年度	3,338	8.0%	2.5%	0.0%	0.9%	1.7%	0.4%

【出典】

「2006年度MRワクチン健康状況調査(速報)」について(予防接種後副反応・健康状況調査検討会委員 堺春美)」

風疹ってどんな病気？

風疹は麻疹(はしか)とよく似た症状を持つ感染症です。風疹の代表的症状である“発熱”と“発疹”が数日で治ることから「三日ばしか」とも呼ばれます。麻疹と比べると症状が軽いことが多いのですが、血小板減少性紫斑病や、脳炎といった合併症を起こすことがあります。また、風疹に伴う最大の問題は妊娠前半期の妊婦の初感染により、風疹ウイルス感染が胎児におよび、先天性心疾患や難聴などの先天異常を含むさまざまな症状を呈する先天性風疹症候群(CRS)が高率に出現することにあります。

「三日ばしか」と呼ばれることから「はしか:麻疹」と「三日ばしか:風疹」を混同している人が多くいますが、この二つは全く別の感染症です。「三日ばしか」にかかったことがあっても「はしか」の免疫を持っていることにはなりませんし、「はしか」にかかったことがあっても「三日ばしか」の免疫を持っていることにはなりません。予防接種を受けて、「はしか:麻疹」と「三日ばしか:風疹」を同時に予防していくという認識が重要です。

【出典】「学校における麻疹対策ガイドライン」、「感染症の話2001年第29週(7月16~22日)掲載 風疹」




<新バーコード表示及び包装形態変更のお知らせ>


厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知「医療用医薬品へのバーコード表示の実施について」(平成18年9月15日、薬食安発第0915001号)に基づき9月出荷分よりバイアルラベル(調剤包装単位)、個装箱(販売包装単位)に新バーコード(GS1-RSS)を、梱包箱ラベル(元梱包装単位)に新バーコード(GS1-128)を表示します。また、新バーコード表示にともない、包装形態が以下のとおり変更となります。

- 母子健康手帳用参考シール
 - 参考シールを全製品に貼付します
 - 製造番号、メーカー名表示に加えて、最終有効年月日(EXP.)を追加します
- 個装箱(2本入り製品のみ)
 - 2本入り製品(フルベックHAやMRワクチン、水痘ワクチン等の凍結乾燥製品)の破瓶対策として、個装箱底に仕切りを追加します
- バイアルラベル
 - 「注射薬の容器への施用部位等表示に関する自主申合せについて」(平成19年9月19日、日薬連発第529号)によりバイアルラベルに皮下接種であることを表示します

<母子健康手帳用参考シールの変更例>



<バイアルラベルの変更例>



企画編集 : 財団法人阪大微生物病研究会 (<http://www.biken.or.jp>)
 9月号担当 : 藤田、福田、長谷、森川、橋本、今井、藤波
 発行 : 財団法人阪大微生物病研究会 / 田辺三菱製薬株式会社

▲上記本文中のホームページの内容に関するお問い合わせは、お受けしておりません。

BI-S07730809B0

