

日本標準商品分類番号	876313
承認番号	16100EZZ01324000
薬価収載	適用外
販売開始	1987年3月
再審査結果	1994年3月

\*生物由来製品 ウイルスワクチン類  
劇薬 生物学的製剤基準  
処方せん医薬品<sup>注)</sup>

## 乾燥弱毒生水痘ワクチン

### 販売名：乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」

貯法：遮光して、5℃以下に保存（【取扱い上の注意】参照）  
有効期間：検定合格日から2年（最終有効年月日は外箱等に表示）  
注）注意－医師等の処方せんにより使用すること

#### 【接種不適当者（予防接種を受けることが適当でない者）】

被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種を行ってはならない。

1. 明らかな発熱を呈している者
2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
3. 本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
4. 妊娠していることが明らかな者
5. 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

#### 【製法の概要及び組成・性状】

##### 1. 製法の概要

本剤は、弱毒生水痘ウイルス（岡株）をヒト二倍体細胞（MRC-5）で培養増殖させ、得たウイルス浮遊液を精製し、安定剤を加え充填した後、凍結乾燥したものである。

なお、本剤は製造工程でウシの血液由来成分（血清）及びブタの膵臓由来成分（トリプシン）を使用している。

##### 2. 組成

本剤を添付の溶剤（日本薬局方注射用水）0.7mLで溶解した時、液剤0.5mL中に次の成分を含有する。

成分		分量
有効成分	弱毒生水痘ウイルス（岡株）	1000PFU以上
緩衝剤	塩化ナトリウム	1.14mg
	塩化カリウム	0.03mg
	リン酸二水素カリウム	0.29mg
	リン酸水素ナトリウム水和物	3.14mg
安定剤	精製白糖	25.0 mg
	L-グルタミン酸ナトリウム	0.36mg
抗菌剤	カナマイシン硫酸塩	7 $\mu$ g（力価）以下
	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	2 $\mu$ g（力価）以下

エリスロマイシンラクトビオン酸塩：ウシの乳由来成分。  
抗菌剤は細胞培養に用いるBME培地中に含有する。

### 3. 性状

本剤は、白色の乾燥製剤である。

添付の溶剤を加えると、速やかに溶解して、無色の澄明又は微白色の液剤となる。

pH：6.8～8.0

浸透圧比（生理食塩液に対する比）：1.0 ± 0.2

#### 【効能又は効果】

本剤は、水痘の予防に使用する。

#### 【用法及び用量】

本剤を添付の溶剤（日本薬局方注射用水）0.7mLで溶解し、通常、その0.5mLを1回皮下に注射する。

#### 用法及び用量に関連する接種上の注意

##### 1. 接種対象者

接種の対象となるのは、生後12月以上の水痘既往歴のない者及び下記(1)～(6)に該当するものである。なお、接種時に下記(1)～(6)に該当していても、接種後2週間以内に治療等により末梢血リンパ球数の減少あるいは免疫機能の低下が予想される場合は、接種を避けること。〔播種性の症状を呈するなどワクチンウイルスの感染を増強させる可能性がある。〕

(1)水痘の罹患が特に危険と考えられるハイリスク患者（急性白血病などの悪性腫瘍患者及び治療により免疫機能に障害をきたしている者及びそのおそれのある者）

- ①急性リンパ性白血病患者の場合には、Ⅰ)完全寛解後少なくとも3カ月以上経過していること。Ⅱ)リンパ球数が500/mm<sup>3</sup>以上であること。Ⅲ)原則として遅延型皮膚過敏反応テストすなわち精製ツベルクリン（PPD）、ジニトロクロロベンゼン（DNCB）又はフィトヘモアグルチニン（PHA、5 $\mu$ g/0.1mL）による反応が陽性に出ること。Ⅳ)維持化学療法とし

での6-メルカプトプリン投与以外の薬剤は、接種前少なくとも1週間は中止し、接種後1週間を経て再開すること。V)白血病の強化療法、あるいは広範な放射線治療などの免疫抑制作用の強い治療を受けている場合には、接種を避けること。

②悪性固形腫瘍患者の場合には、摘出手術又は化学療法によって腫瘍の増殖が抑制されている状態にある症例に接種する。その場合の条件は白血病に準ずる。

③急性骨髄性白血病、T細胞白血病、悪性リンパ腫の場合には、原疾病及び治療薬によって一般に続発性免疫不全状態にあり臨床反応が出やすく抗体価の上昇も悪いので、本剤の接種は推奨されない。

(2)ネフローゼ、重症気管支喘息などでACTH、コルチコステロイドなどが使用されている場合は、原則として症状が安定している症例が接種対象となる。薬剤などによる続発性免疫不全が疑われる場合には、細胞免疫能遅延型皮膚過敏反応テスト等で確かめた後に接種を行う。

(3)緊急時（例えば感受性白血病人が水痘患者と密に接触した場合等）で、帯状ヘルペス免疫グロブリンが利用できない場合には、上記(1)、(2)に該当しなくても、接触後72時間以内に接種を行うこと。ただし、このような場合においても、免疫機能が特に障害を受けていると思われる場合（例えばリンパ球数 $500/\text{mm}^3$ 以下）は接種を避けること。〔過去の成績では本剤の副反応の程度に比較して自然水痘に罹患した場合の症状がより重篤で危険性が高いものと判断できる。〕

(4)上記(1)～(3)のハイリスク患者の水痘感染の危険性を更に減じるために予防接種を受けたハイリスク患者と密に接触する感受性者も接種対象となる。これにはハイリスク患者の両親、兄弟などの同居者及び各患者の医療に関係する者が該当する。

(5)成人では水痘が重症になる危険性が高いので、水痘に感受性のある成人、特に医療関係者、医学生、水痘ウイルスに対する免疫能が低下した高齢者<sup>1)</sup>及び妊娠時の水痘罹患防止のため成人女子は接種対象となる。

(6)本剤は病院の病棟若しくは学校の寮など閉鎖共同体における感受性対象者の予防または蔓延の終結ないしは防止に使用できる。

## 2. 不活化ワクチン製剤との接種間隔

不活化ワクチンの接種を受けた者は、通常、6日以上間隔を置いて本剤を接種すること。

## 3. 輸血及びガンマグロブリン製剤投与との関係（「相互作用」の項参照）

## 4. 他の生ワクチン製剤接種との関係（「相互作用」の項参照）

## 【接種上の注意】

### 1. 接種要注意者（接種の判断を行うに際し、注意を要する者）

被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質を勘案し、診察及び接種適否の判断を慎重に行い、予防接種の必要性、副反応、有用性について十分な説明を行い、同意を確実に得た上で、注意して接種すること。

- (1)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
- (2)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
- (3)過去にけいれんの既往のある者
- (4)過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
- (5)明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者（【用法及び用量】（用法及び用量に関連する接種上の注意）の項参照）
- (6)本剤の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者

### 2. 重要な基本的注意

- (1)本剤は、「**予防接種実施規則**」及び「**定期の予防接種実施要領**」に準拠して使用すること。
- (2)被接種者について、**接種前に必ず問診、検温及び診察**（視診、聴診等）によって健康状態を調べること。
- (3)本剤は、妊娠可能な婦人においては、**あらかじめ約1カ月間避妊した後接種すること**、及びワクチン接種後約2カ月間は妊娠しないように注意させること。
- (4)被接種者又はその保護者に、接種当日は過激な運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の**健康監視**に留意し、局所の異常反応や体調の変化、さらに高熱、けいれん等の**異常な症状**を呈した場合には速やかに**医師の診察**を受けるよう事前に知らせること。

### 3. 相互作用

#### 併用注意（併用に注意すること）

#### (1)輸血及びガンマグロブリン製剤投与との関係

本剤を輸血及びガンマグロブリン製剤の投与を受けた者に接種した場合、輸血及びガンマグロブリン製剤中に水痘抗体が含まれると、ワクチンウイルスが中和されて増殖の抑制が起こり、本剤の効果が得られないおそれがある。

接種前3カ月以内に輸血又はガンマグロブリン製剤の投与を受けた者は、3カ月以上すぎるまで本剤の接種を延期すること。また、ガンマグロブリン製剤の大量療法、すなわち川崎病、特発性血小

板減少性紫斑病 (ITP) の治療において200mg/kg 以上投与を受けた者は、6カ月以上すぎるまで接種を延期することが望ましい。

本剤接種後14日以内にガンマグロブリン製剤を投与した場合は、投与後3カ月以上経過した後に本剤を再接種することが望ましい。

#### (2)他の生ワクチン製剤接種との関係

他の生ワクチン(経口生ポリオワクチン、麻しんワクチン、おたふくかぜワクチン、風しんワクチン、BCGワクチン、黄熱ワクチン等)の干渉作用により本剤のウイルスが増殖せず免疫が獲得できないおそれがあるので、他の生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27日以上間隔を置いて本剤を接種すること。

#### 4. 副反応 (まれに:0.1%未満、ときに:0.1~5%未満、副詞なし:5%以上又は頻度不明)

##### (1) 重大な副反応

1) **アナフィラキシー様症状**:まれにアナフィラキシー様症状(蕁麻疹、呼吸困難、口唇浮腫、喉頭浮腫等)があらわれることがあるので、接種後は観察を十分に行うこと。

2) **急性血小板減少性紫斑病**:まれに(100万人接種あたり1人程度)急性血小板減少性紫斑病があらわれることがある。通常、接種後数日から3週ごろに紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血等があらわれる。本症が疑われる場合には、血液検査等の観察を十分に行い、適切な処置を行うこと。

##### (2) その他の副反応

1) **過敏症**:まれに接種直後から翌日に発疹、蕁麻疹、紅斑、そう痒、発熱等があらわれることがある。

2) **全身症状**:健康小児及び成人に本剤を接種すると、接種後1~3週間ごろ、ときに発熱、発疹が発現することがあるが、一過性で、通常、数日中に消失する<sup>2)~6)</sup>。

ハイリスクの患者に本剤を接種した場合、接種後14~30日に発熱を伴った丘疹、水疱性発疹が発現することがある。このような臨床反応は通常の接種では急性リンパ性白血病患者の場合約20%である。

本剤接種後のハイリスク患者には帯状疱疹が生じることがあるが、その発生率は自然水痘に感染した非接種患者に比べて同等ないしは低率である。

3) **局所症状**:まれに発赤、腫脹、硬結等があらわれることがある。

#### 5. 高齢者への接種

一般に高齢者では、生理機能が低下しているので、接種に当たっては、予診等を慎重に行い、被接種者

の健康状態を十分に観察すること。

#### 6. 接種時の注意

##### (1)接種時

1) 接種用器具は、ガンマ線等により滅菌されたディスポーザブル品を用いる。

2) 本剤の溶解に当たっては、容器の栓及びその周囲をアルコールで消毒した後、添付の溶剤で均一に溶解して、所要量を注射器内に吸引する。この操作に当たっては雑菌が迷入しないよう注意する。また、栓を取り外し、あるいは他の容器に移し使用してはならない。

3) 注射針の先端が血管内に入っていないことを確かめること。

4) 注射針及び注射筒は、被接種者ごとに取り換えなければならない。

##### (2)接種部位

接種部位は、通常、上腕伸側とし、アルコールで消毒する。

#### 【臨床成績】

##### 1. 有効性

本剤を健康小児に接種した場合、90%以上は抗体陽転するが、長期追跡調査の結果、被接種者の約20%は罹患するとの報告がある。ただし、発症した場合でも多くは軽症(発疹50個以下)に経過するが、中には自然水痘と同様な症状を示すことがある<sup>7)</sup>。

白血病などのハイリスク児の場合、ワクチン接種前後の化学療法のある方などにより免疫機能が低下し、罹患する例があり、罹患率は健康小児に比べ若干高い傾向がある<sup>8)</sup>。

本剤を高齢者に接種した場合、50~69歳で約90%、70歳台で約85%に水痘ウイルスに対する細胞性免疫が上昇したとの報告がある<sup>1)</sup>。

##### 2. 安全性

本剤を健康小児に接種した場合の副反応は少なく<sup>9)</sup>、使用成績調査(昭和61年~平成4年)の結果、軽微な発熱・発疹及び局所の発赤・腫脹は約7%(580/8429)であった。

また、種々の基礎疾患をもった小児に接種した場合でも、悪性腫瘍をもった小児以外では副反応は少ないとの報告がある<sup>10)</sup>。

#### 【薬効薬理】

水痘ウイルスは、飛沫感染により眼球結膜、上気道又はこの両部位に初感染し、局所リンパ節で増殖して第一次ウイルス血症を起こし、全身臓器に運ばれる。各臓器で再増殖の後、第二次ウイルス血症を経て発症すると考えられている。皮膚細胞で増殖した水痘ウイルスは水疱を形成するが、そのウイルスは

知覚神経を上行性に伝わって三叉神経節や脊髄後根神経節の細胞に感染し、そこに長期間潜在すると考えられている<sup>11)</sup>。

予め水痘ワクチンが接種されていると、液性及び細胞性免疫が獲得され、ウイルスの増殖は阻害されて、水痘の発症は防御される。また、この免疫は長期間にわたり持続するものと推定されている<sup>12)</sup>。

しかし、加齢等により水痘ウイルスに対する免疫、特に細胞性免疫が低下した場合、神経節に潜在したウイルスが再活性化し、逆行性・遠心性に知覚神経を伝わって帯状疱疹を発症することがある。この皮膚病変は、末梢神経に沿って帯状に形成された疼痛をとともなう小水疱群としてみられる<sup>11)</sup>。

本剤を接種すると、水痘ウイルスに対する免疫、特に細胞性免疫が増強されることが認められている<sup>1)</sup>。

- 8) Gershon, A. A. et al.: N. Eng. J. Med., **320**: 892 (1989)
- 9) 堀内 清: 臨床とウイルス, **11** (2): 42 (1983)
- 10) 馬場宏一: 臨床とウイルス, **11** (2): 33 (1983)
- 11) 高橋理明/新村真人: 水痘・帯状疱疹 (1988)
- 12) 浅野喜造 他: 臨床小児医学, **31** (6): 63 (1983)

#### \*\*【文献請求先】

一般財団法人 阪大微生物病研究会 学術課  
〒565-0871 吹田市山田丘3番1号  
電話 0120-280-980

田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター  
〒541-8505 大阪市中央区北浜2-6-18  
電話 0120-753-280

### 【取扱い上の注意】

#### 1. 接種前

- (1) 溶解時に内容をよく調べ、沈殿及び異物の混入、その他異常を認めたものは使用しないこと。
- (2) 本剤のウイルスは日光に弱く、速やかに不活化されるので、溶解の前後にかかわらず光が当たらないよう注意すること。

#### 2. 接種時

本剤の溶解は接種直前に行い、一度溶解したものは直ちに使用する。

### 【包装】

瓶入 1人分 1本  
溶剤 (日本薬局方注射用水) 0.7mL 1本添付

### 【主要文献】

- 1) Takahashi, M. et al.: Vaccine, **21** (25): 3845 (2003)
- 2) 高山直秀 他: 感染症学雑誌, **60** (12): 1311 (1986)
- 3) 勝島矩子 他: 臨床とウイルス, **14**: 80 (1986)
- 4) 加藤達夫 他: 小児保健研究, **50** (5): 616 (1991)
- 5) White, C. J. et al.: Pediatrics, **87** (5): 604 (1991)
- 6) Gershon, A. A. et al.: The Journal of Infectious Diseases, **166** (Suppl.): 63 (1992)
- 7) 水痘ワクチン前方視的調査全国集計 (第7報)、平成10年7月、厚生省予防接種研究班、予防接種リサーチセンター