

ゴービック水性懸濁注シリンジ 副反応発現状況

集計期間：2024年3月15日～2025年1月31日

副反応の種類		自発報告 件数			使用成績調査 件数		
器官別大分類 (SOC)	基本語 (PT)	重篤	非重篤	合計	重篤	非重篤	合計
胃腸障害	下痢		3	3		1	1
	血便排泄		1	1			
	軟便		1	1			
	排便回数増加		1	1			
	腹痛		1	1			
	腹部膨満		1	1			
	変色便		1	1			
	便秘		1	1			
	嘔吐	1	7	8		1	1
一般・全身障害および投与部位の状態	活動性低下		3	3			
	泣き		23	23			
	倦怠感		1	1			
	硬結		1	1			
	腫脹		5	5			
	腫瘤		1	1			
	注射部位硬結		16	16		17	17
	注射部位紅斑		24	24		26	26
	注射部位腫脹		45	45		18	18
	注射部位出血		1	1			
	注射部位熱感		4	4		2	2
	注射部位疼痛		17	17			
	乳児突然死症候群	1		1			
	発熱	8	340	348		61	61
疼痛		2	2				
感染症および寄生虫症	ヘモフィルス性髄膜炎	1		1			
	腎盂腎炎	1		1			
	中耳炎		1	1			
	百日咳		1	1			
	蜂巣炎	1	1	2			
眼障害	注視麻痺		1	1			
筋骨格系および結合組織障害	筋肉痛		1	1			
血液およびリンパ系障害	血小板減少性紫斑病	1		1			
	免疫性血小板減少症	1		1			
血管障害	チアノーゼ		1	1			
	蒼白	1	5	6			
	潮紅		3	3			
呼吸器、胸郭および縦隔障害	咽頭紅斑		2	2			
	咳嗽		2	2			
	低酸素症		1	1			
	鼻漏		2	2			
	無呼吸		2	2			
神経系障害	意識レベルの低下	1		1			
	過眠症		1	1			
	失神寸前の状態		1	1			
	振戦		1	1			
	熱性痙攣	2	1	3			
	痙攣発作		1	1			
精神障害	気分変化		4	4		1	1

副反応の種類		自発報告 件数			使用成績調査 件数		
器官別大分類 (SOC)	基本語 (PT)	重篤	非重篤	合計	重篤	非重篤	合計
代謝および栄養障害	食欲減退		10	10			
皮膚および皮下組織障害	紅斑	1	9	10			
	紫斑	1		1			
	湿疹		2	2			
	多汗症		2	2			
	点状出血		3	3			
	発疹		14	14			
	蕁麻疹		3	3			
免疫系障害	アナフィラキシー反応		3	3			
臨床検査	C-反応性蛋白増加		1	1			
総計		21	579	600	0	127	127

(MedDRA/J ver.27.1)

- 当該期間に入手し、企業の評価結果がデータベースに入力された副反応を集計しています。
- 本情報は現在調査中の症例情報も含むため、今後の追加情報により内容の変更が生じる場合があることをあらかじめご了承ください。